son existence à devenir un être anaérobie, remplissant les fonctions visibles, constatables à l'observation, que nous lui avons vu remplir; et les remplissant avec le plus de puissance lorsqu'il va être privé d'air d'oxygène libre, et qu'il est obligé de vivre aux dépens de l'oxygène combiné des matières qui l'environnent.

SUPPLÉMENT A LA LISTE DES PLANTES RARES OU INTÉRESSANTES (PHANÉROGAMES, CRYPTOGAMES SUPÉRIEURES ET CHARACÉES) DES ENVIRONS DE MONTFORT-L'AMAURY ET DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET (SEINE-ET-OISE);

par **M^lle^ Marguerite BELEZE** (1).

Myosurus minimus L. — Champs humides. Plaine de M^t^ et à Saint-Léger (F. de R.).

Ranunculus hederaceus L. — Rigoles, dans la cour de la ferme Larcher (Saint-Léger); F. de R.

R. Delacouri G. et Mab. — Bois humides. Allée de Saint-Laurent, routes des Longues-Mares et de Vitry (F. de R.).

R. Questieri Billot. — Mêmes localités et poteau du Chêne-Montavale (F. de R.).

Helleborus fœtidus L. — Bois de Beynes et vieux murs à Galluis, près M^t^.

Diplotaxis muralis DC. — Champs, à Méré, près M^t^, où il tend à disparaître.

Teesdalia nudicaulis R. Br. — Pelouses sèches. Autour du *Dolmen* dit de la « *Pierre-Ardroue* » et au croisement de la route aux Vaches avec celle de Bazôches (F. de R.).

Helianthemum guttatum Mill. — Sables chauds et arides du chemin de la « *Pierre-Ardroue* » au Jardinet (Saint-Léger), et berges de l'étang du Roi (Poigny); F. de R.

Viola canina L. — Lieux arides, aux mares Moussues, plaine de M^t^; routes des Fonds aux Mesnuls, de Saint-Léger à Montfort, près le parc d'En-Haut et carrefour du Monnereau (F. de R.).

Parnassia palustris L. — Prairies spongieuses et tourbeuses. Prés Jaunot, à Gambayseuil et au Maupas (Saint-Léger); F. de R.

Polygala depressa Wender. — Bruyères, et parmi les Ajoncs; plaine

(1) Voy. le Bulletin, t. XLII, p. 494 (1895). Comme précédemment, M^t^ et F. de R. sont les abréviations de Montfort-l'Amaury et de Forêt de Rambouillet.

de Mt. Bords des étangs de Hollande; landes humides au Maupas et près Jaunot à Gambayseuil (F. de R.).

Gypsophila muralis L. — Autour de la ferme de Chatelvy, à Mt; bords des étangs de Hollande, de Saint-Hubert et des Morues (F. de R.).

Silene Otites Sm. — Endroits sablonneux, à Saint-Léger (F. de R.).

Mœnchia erecta (*Fl. Wett.*). — Chemins herbeux de la mare Chantreuil et de la plaine de Mt.

Stellaria uliginosa Murr. — Rigoles de la tourbière du Maupas et de la cour de la ferme Larchet (Saint-Léger); F. de R.

Tilia platyphyllos Scop. — Ponts-Quentins et Clos-Renard (F. de R.).

T. silvestris Desf. — Taillis, en face la Croix Saint-Jacques de Saint-Léger (F. de R.).

Malva moschatà L. — Taillis, à Grosrouvres, près Mt, et au parc d'En-Haut (F. de R.).

M. Alcea L. — Jeunes taillis, au Chêne-Rogneux, près Mt.

Geranium pyrenaicum L. — Très répandu, dans les endroits herbeux, à Mt et aux environs.

Hypericum hirsutum L. — Taillis des routes du Grand-Veneur et des Sangliers aux Glands (près l'étang Neuf); F. de R.

H. quadrangulum L. — Chemin-Vert, près Mt; Ponts-Quentins (F. de R.).

Ulex nanus Sm. — Mares Moussues (plaine de Mt) et Chêne-Rogneux; Croix-Patère, Butte-Rouge, Haut-Cornu; routes Belsédène et des Essartons (F. de R.).

Genista anglica L. — Mêmes localités.

Lotus tenuis Kit. — Lieux humides. Bords des étangs des Morues et de Hollande; prairies tourbeuses du Maupas (Saint-Léger); F. de R.

Tetraganolobus siliquosus Roth. — Bords des fossés argileux, à Garancière, près Mt (G. Monbeig!).

Trifolium ochroleucum L. — Lieux herbeux. Route des Graviers à Mareil, près Mt; Prés-aux-Princes (F. de R.).

T. medium L. — Petit bois à Beauregard, près Mt.

Ervum gracile DC. — Moissons et prairies. Maison-Rouge, mare Chantreuil, Mareil et ancien étang de Haute-Bruyère (Saint-Rémy), près Mt.

Lathyrus silvestris L. — Taillis de la mare Ronde (F. de R.).

Cerasus Mahaleb Mill. — Haies, à Mt (rare).

Rubus idæus L. — Taillis. Parc d'En-Haut ; route de la Croix-Patère au carrefour du Monnereau; allée de Saint-Laurent et autour des étangs Neuf et de Hollande (F. de R.).

Malus acerba Mérat. — Parc d'En-Haut et Ponts-Quentins (F. de R.).

Sorbus domestica L. — Prairies de la ferme de la Vignette, à M[t].

Myriophyllum verticillatum DC. — Étangs de la prairie de M[t], de Hollande et Neuf; mares de Villepair et rigole de l'étang Rompu à Gambayseuil (F. de R.).

Œnothera biennis L. — Bords des chemins, à la « *Brèche-des-Champs* », à Méré et à Galluis; bois de la mare Chantreuil, près M[t].

Epilobium spicatum Lamk. — Taillis, route du grand Baliveau (F. de R.).

E. montanum L. — Très commun dans les bois autour de M[t] et dans toute la F. de R.

Montia montana L. — Lieux humides et inondés l'hiver. Bords des étangs des Morues et de Hollande; route aux Vaches (F. de R.).

Scleranthus perennis L. — Champs, à Montrôti, près M[t].

Crassula rubens L. — Talus et vieux murs. Commun à M[t] et dans toute la région.

Sedum Cepæa L. — Talus ombragés, à Saint-Nicolas, Méré, la « *Butte-à-Boutry* » (les Mesnuls) et M[t]; Saint-Léger et Gambayseuil (F. de R.).

Sempervivum tectorum L. — Vieux murs et toits en chaume. Le Buisson (Grosrouvres, près M[t]; Saint-Léger, F. de R.). Assez rare en fleurs.

— Forme à fleurs de couleur pâle et plante bien plus blanche dans toutes ses parties, rappelant un peu le *Monotropa Hypopytis* L.
— Vieux murs du faubourg de la Brosse à M[t].

Ægopodium Podagraria L. — Prairies et bords des eaux, à Mareil et à Neauphle-le-Vieux, près M[t].

Carum Bulbocastanum Koch. — Moissons, entre Bardelle et la gare de M[t].

Torilis infesta Duby. — Haies, à Egremont, près M[t].

Pastinaca silvestris Mill. — Moissons. Méré, les Mesnuls et Galluis, près M[t]; Gambayseuil, Saint-Léger et Poigny (F. de R.).

Silaus pratensis L. — Prairies, aux Mesnuls et à Galluis, près de M[t].

Bois humides, autour de l'étang Neuf, surtout route du Champs-Mauduit et de la Vente-aux-Moines (F. de R.).

Pimpinella saxifraga var. *dissecta* C. et G. = *P. pratensis* Thuill. — Bois de la mare Chantreuil, près M[t].

Chærophyllum silvestre L. — Haies, à Gaudigny, à Méré et à M[t].

Selinum Carvifolia L. — Bois humides. Routes du Champs-Mauduit, de Vitry à l'étang Neuf et de la Vente-aux-Moines (F. de R.).

Phellandrium aquaticum L. — Mare de la plaine de M[t]; étangs de Hollande et du Perray; mares de Villepair (F. de R.).

Centranthus ruber DC. — Vieux murs. « *Impasse des Jardins* ». Remparts du XI[e] siècle (lieu dit les « *Poulies* »), à M[t].

Pyrethrum Parthenium Sm. — Lieux incultes, à M[t].

Senecio silvaticus L. — Mares Moussues et mare Chantreuil, près M[t]; route du Jardinet à Larcher et Croix Saint-Jacques de Saint-Léger (F. de R.).

Chrysanthemum segetum L. — Moissons et champs en friche. Méré et plaine de M[t]; les Haysettes, Saint-Léger, les Basses-Mazures et Poigny (F. de R.).

Filago germanica L. — Talus arides, à Montrôti et à Méré, près M[t].

— var. *canescens* Jord. — Mêmes localités (G. Monbeig!).

Filago gallica L. — Talus, à Montrôti et dans les bois de Pontchartrain, près M[t]; route Belsédène, près l'étang des Morues, étang de Saint-Léger à M[t] (F. de R.).

Chondrilla juncea L. — Montrôti, chemin Vert, Méré, près M[t]; Mareil, le Jardinet et les Basses-Mazures (F. de R.).

Lactuca saligna L. — Lieux pierreux, à Méré, près M[t].

Hieracium lævigatum Willd. — Bois. Carrefour du Monnereau (F. de R.).

— var. *boreale* Fries. — Bois, autour du Pré-au-Prince (F. de R.).

Campanula glomerata L. — Prairies et talus herbeux. Ferme de la Vignette, Montrôti, Méré, les Mesnuls et Galluis, près M[t]; Saint-Léger et Gambayseuil (F. de R.).

C. persicifolia L. — Bois de la mare Chantreuil, près M[t].

Specularia hybrida A. DC. — Moissons. Montrôti, Méré, les Mesnuls, Vicq et Boissy, près M[t].

Anagallis tenella L. — Sur les *Sphagnum*. Tourbière du Maupas (Saint-Léger); fossés, routes des Quatre-Piliers à l'étang Neuf, de

la Charmoie aux Fontaines-Blanchet. Prés Jaunot à Gambayseuil (F. de R.).

Samolus Valerandi L. — Mares, à Saint-Léger et rigole derrière l'étang Neuf (Gambays.); F. de R.

Centunculus minimus L. — Endroits herbeux et ombragés. Carrefours des Croix de Villepair et Patère; prés Jaunot à Gambayseuil et chaussée de l'étang du Roi (Poigny); F. de R.

Menyanthes trifoliata L. — Mares Moussues, plaine de Mt et étang de Pourras (F. de R.).

Limnanthemum Nymphoides H. et L. — Étang Neuf (Gambays.); F. de R.

Gentiana Pneumonanthe L. — Bruyères humides, prairies spongieuses et sylvatiques des environs de Mt et de toute la F. de R. On trouve souvent des spécimens dout les corolles sont à 6-7-8 lobes; çà et là avec le type.

Cicendia filiformis Delarb. — Prés Jaunot, à Gambayseuil (F. de R.).

Cynoglossum officinale L. — Terrains remués. Avenue du chemin de fer de Mt.

Solanum nigrum L. var. *ochroleucum* Bast. — Décombres, à Méré, près Mt.

Physalis Alkekengi L.— Vignes, entre Méré et Gueswillers, près Mt.

Datura Stramonium L. — Avenue du chemin de fer de Mt; ferme de la Vignette et entrée du chemin du Val.

Antirrhinum majus L. — Subspontané? Vieux murs à Mt (les Poulies).

Veronica triphyllos L.— Champs sablonneux, arides. Montrôti, Chemin-Vert et Méré, près Mt; Saint-Léger et Poigny (F. de R.).

V. scutellatus L. — Mares, au parc d'En-Haut; bords des étangs de Hollande et rigole de l'étang Neuf (F. de R.).

Lamium incisum Willd. — Lieux incultes et cultivés; ruelle des Prés (Gaudigny), à Mt.

Brunella grandiflora Jacq. — Prairies, entre Galluis et Mt.

Leonurus Cardiaca L.— Haies, au « *Rocher-Marquant* » (Houjarré) et à Launay-Bertin, près Mt.

Rumex maritimus L. — Sables humides; bords des étangs de la Grange-du-Bois, près les Mesnuls, des Morues et de Hollande (F. de R.).

Polygonum mite Schrank. — Ruisseau du Colombier à Méré, près M^t; bords des étangs des Morues et de Hollande (F. de R.).

P. dumetorum L. — Haies, buissons. La Millières (les Mesnuls) et chemin du Bois-Renou, près M^t, et chaussée de l'étang Neuf (F. de R.).

Myrica Gale L. — Prés Jaunot à Gambayseuil (F. de R.).

Ornithogalum pyrenaicum L. — Prairies sylvatiques. Ferme de Chatelvy et chemin du Bois-Renou, près M^t.

Loroglossum hircinum Rich. — Prairies. Plaine de M^t, près le parc d'En-Haut (G. Monbeig!).

Epipactis atrorubens Hoffm. — Bois d'Egremont, près M^t, et taillis autour du Chêne-Baudet (F. de R.).

Neottia Nidus-avis Rich. — Taillis humides, au Chêne-Baudet (F. de R.).

Sparganium simplex Huds. — Rigole de l'étang Rompu, à Gambayseuil (F. de R.).

Luzula congesta Lej. var. *pallescens* Hoppe. — Allées herbeuses de la mare Ronde, au poteau des Deux-Châteaux (F. de R.).

Cyperus fuscus L. — Sables humides. Bords de l'étang des Morues (F. de R.).

C. flavescens L. — Endroits tourbeux. Prés Jaunot à Gambayseuil (F. de R.).

Carex pulicaris L. — Clairières tourbeuses; sous *Myrica Gale*. Route de Vitry à l'étang Neuf (F. de R.).

C. stellulata Good. — Prairies spongieuses. Chemin-Vert, près M^t et prés Jaunot à Gambayseuil (F. de R.).

C. ampullacea Good. — Lieux tourbeux. Le Maupas (Saint-Léger), et prés Jaunot à Gambayseuil (F. de R.).

C. maxima Scop. — Rigoles, à la Blotterie; près l'étang de Haute-Bruyère (Saint-Rémy-l'Honoré), près M^t.

C. fulva Good. — Bords de l'étang des Morues (F. de R.).

Calamagrostis lanceolata Roth. — Étang de Guipéreux, près Poigny (F. de R.) [E. Jeanpert!].

Alopecurus fulvus Sm. — Mares de Gaudigny, près M^t et de Villepair (F. de R.).

Avena fatua L. — Moissons. C. à M^t et dans toute la région.

A. pratensis L. — Prairies, entre Galluis et M^t.

Poa compressa L. — Vieux murs et talus secs, à M[t] et dans toute la région.

P. angustifolia C. et G. — Lieux incultes, à M[t].

Glyceria plicata Fries. — Bords de la Vesgres, au Maupas (Saint-Léger); F. de R.

Catabrosa aquatica P. B. — Ruisseau du Colombier à Méré, canal du parc de Blainvilliers (les Mesnuls), et petites mares au Chêne-Rogneux, près M[t]; rigoles, au Maupas (F. de R.).

Deschampsia cæspitosa P. B. — Bords des eaux, fossés, mares et étangs des environs de M[t] et de la F. de R.

— s.-var. *parviflora* C. et G. — Fossés. Route de Galluis, chemins du Val et de Gaudigny, près M[t].

Asplenium Adiantum-nigrum L. — AC. dans les bois des environs de M[t] et dans la F. de R.

A. Filix-fœmina Bernh. — Chemins creux et humides à Gambayseuil; endroits ombragés, au Maupas (Saint-Léger) et autour de l'étang Neuf (F. de R.).

Osmunda regalis L. — Prés Jaunot à Gambayseuil (F. de R.).

Nitella opaca Agardh. — Étang de Saint-Quentin, près Trappes (Seine-et-Oise) [E. Jeanpert!].

M. G. Camus fait la communication suivante :

STATIONS NOUVELLES DE PLANTES RARES OU CRITIQUES DE LA FLORE PARISIENNE, par M. E.-G. CAMUS.

J'ai l'honneur de faire connaître à la Société les résultats de deux herborisations faites dans les environs de Paris.

Dans le parc du Petit-Trianon, j'ai récolté le *Ranunculus confusus*, plante signalée seulement à Fontainebleau; le *Chara connivens*, espèce assez abondante, mais localisée dans la partie sud-est de l'étang de Saint-Quentin, près de Trappes. Cette station du Petit-Trianon indique que le *Chara connivens* pourra probablement être recherché avec succès dans les canaux et étangs du plateau compris entre Versailles et Rambouillet.

Fin de juin, j'ai fait une excursion dans le marais de Liancourt-Saint-Pierre, dans lequel je pensais, par suite de la proximité et de l'analogie du terrain, retrouver les mêmes plantes que dans le